







FOLFIRI療法を受けられる患者さんへ

お名前

様

担当医:

説明看護師:

月日	/	/	/	/	/ ~
経過	治療前日	治療当日	2日目	3日目	4日目~退院
達成目標	<ul style="list-style-type: none"> 治療について理解できる 副作用について理解できる 				<ul style="list-style-type: none"> 日常生活の注意点について理解できる
治療・薬剤 (点滴・内服) 処置		吐き気止めとイリノテカンとレボホリナートと5-FUを点滴します。全部で2時間30分程かかります。 	最後に5-FUを23時間で投与します。(合計46時間) → 5-FUを23時間で投与します。 →		
検査	採血がある場合があります 				
活動・安静度	制限はありません 				
食事	食事制限はありません 				
清潔	シャワー浴できます 	治療当日にシャワー浴される場合は、点滴前に済ませて下さい 点滴中は体拭きができます			シャワー浴できます 
排泄	トイレに行けます				
患者様及びご家族への説明	医師及び薬剤師より治療内容の説明があります		<ul style="list-style-type: none"> 主な副作用には吐き気・吐く・食欲がなくなる・だるさ・口内炎・白血球減少・下痢などがあります。 イリノテカンの副作用で、点滴中に下痢・鼻水がでる・涙がでる・汗がでるなどの症状が起こることがあります。症状がひどいときは注射薬を使用する場合があります。 吐き気などの症状が現れた場合は、我慢せずに看護師にお知らせください。内服や注射で症状の軽減をはかります。 血管炎を起こすことがあるので、点滴している周囲に痛み・赤みなどが出た場合はお知らせください。 食欲がなくなって食事が十分に食べられない場合には、栄養士による相談が受けられます。 手洗い・うがいをこころがけましょう。 