







# アバスチン・sLV5FU2療法を受けられる患者さんへ

お名前

様

担当医:

説明看護師:

月日	/	/	/	/	/ ~
経過	治療前日	治療当日	2日目	3日目	4日目~退院
達成目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>治療について理解できる</li> <li>副作用について理解できる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>チューブとインフューザポンプの取り扱いがわかる</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ポート針の抜き方がわかる</li> <li>日常生活の注意点について理解できる</li> </ul>	
治療・薬剤 (点滴・内服) 処置		<p>吐き気止めとアバスチンとレボホリナートと5-FUを点滴します。全部で3~4時間程かかります。</p>  <p>最後に5-FUをインフューザーポンプで投与します。(46時間)</p> <p>アバスチン投与中は心電図モニターを装着します。</p>		<p>インフューザーポンプの中身がなくなったら、針を抜いて終了です。</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">針を抜く方法を指導します</div>	
検査	採血がある場合があります 				
活動・安静度	制限はありません 				
食事	食事制限はありません 				
清潔	シャワー浴できます 	治療当日にシャワー浴される場合は、点滴前に済ませてください インフューザーポンプでの投与中は下半身シャワー浴はできません			シャワー浴できます 
排泄	トイレに行けます				
患者様及びご家族への説明	<p>医師及び薬剤師より治療内容の説明があります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>主な副作用には吐き気・吐く・食欲がなくなる・だるさ・アレルギー症状・白血球減少・下痢・しびれ・粘膜からの出血・血圧が高くなるなどがあります。</li> <li>吐き気などの症状が現れた場合は、我慢せずに看護師にお知らせください。内服や注射で症状の軽減をはかります。</li> <li>食欲がなくなって食事が十分に食べられない場合には、栄養士による相談が受けられます。</li> <li>定期的にCVポート刺入部とインフューザーポンプを確認します。</li> <li>外来化学療法室でできる抗がん剤治療なので、次回より外来通院で治療します。</li> <li>退院前に外来化学療法室に見学に行きます。</li> <li>高血圧になることがありますので、退院後も1日1回の血圧測定を推奨します。</li> <li>手洗い・うがいをこころがけましょう。</li> </ul> 