

SP療法(初回)を受けられる患者さんへ

お名前

様

担当医:

説明看護師:

月日	/	/ ~ /	/	/	/	/	/	/ ~	
経過	ティーエスワン投与日	2~6日	7日	シスプラチン投与日	シスプラチン投与後1日目	シスプラチン投与後2日目	シスプラチン投与後3日目	シスプラチン投与後4日目~退院	
達成目標	<ul style="list-style-type: none"> 治療について理解できる 副作用について理解できる 							<ul style="list-style-type: none"> 日常生活の注意点について理解できる ティーエスワンの内服管理ができる 	
治療・薬剤(点滴・内服)処置	day1 夕食後よりティーエスワン内服開始			シスプラチンと吐き気予防と利尿剤と水分補給の点滴をします。全部で12時間程かかります。 	吐き気予防と水分補給の点滴をします。全部で11時間程かかります。 	吐き気止めの薬(デカドロン)を飲みます。→		吐き気止めの薬(アプレピタントカプセル)を飲みます。→	
検査	採血をする場合があります 		採血をする場合があります 	朝食前に体重を測定します 	朝食前に体重を測定します 	朝食前に体重を測定します 	朝食前に体重を測定します 		
活動・安静度	制限はありません 								
食事	食事制限はありません 								
清潔	シャワー浴できます 								
排泄				11時から尿の量を測定してください。トイレに設置しているコップで量を測って、用紙に記入してください。(24時間)	11時で尿の測定は終了です。				
患者様及びご家族への説明	医師及び薬剤師より治療内容の説明があります			<ul style="list-style-type: none"> 主な副作用には吐き気・吐く・食欲がなくなる・だるさ・下痢・口内炎・白血球減少などがあります。 吐き気・下痢・しゃっくりなどの症状が現れた場合は、我慢せずに看護師にお知らせください。内服や注射で症状の軽減をはかります。 たくさんの点滴や利尿剤を使用するので、普段より尿の量が多くなります。 尿量が少ない場合は、追加で利尿剤を使用することがあります。 食欲がなくなって食事が十分に食べられない場合には、栄養士による相談が受けられます。 手洗い・うがいをこころがけましょう。 				 	