






パクリタキセル療法を受けられる患者さんへ

お名前

様

担当医:

説明看護師:

月日 経過	／ 治療前日	／ 治療当日	／ ～ 2日目～退院
達成目標	<ul style="list-style-type: none"> ・治療について理解できる ・副作用について理解できる 		<ul style="list-style-type: none"> ・日常生活の注意点について理解できる
治療・薬剤 (点滴・内服) 処置		<p>アレルギーと吐き気を予防する点滴をして、パクリタキセルの点滴をします。 全部で2時間程かかります。</p> <p>パクリタキセルの点滴中は心電図モニターを付けます。 アレルギー症状が起きていないか観察します。</p> 	
検査	採血がある場合があります 		
活動・安静度	制限はありません 		
食事	食事制限はありません 		
清潔	シャワー 浴できます 		
排泄	トイレに行けます		
患者様及び ご家族への 説明	医師及び薬剤師より治療内容の説明があります	<ul style="list-style-type: none"> ・主な副作用には吐き気・吐く・食欲がなくなる・だるさ・アレルギー症状・白血球減少・手先や足先のしびれ・筋肉痛・関節痛・発熱・口内炎・脱毛などがあります。 ・点滴中にアレルギー症状で発疹・かゆみ・発熱・息苦しさ・動悸などが現れたら、すぐにお知らせください。 ・アレルギー予防のお薬を点滴しますので、眠くなる場合があります。 ・吐き気などの症状が現れた場合は、我慢せずに看護師にお知らせください。内服や注射で症状の軽減を図ります。 ・食欲がなくなって食事が十分に食べられない場合には、栄養士による相談が受けられます。 ・パクリタキセル投与2～3日後に筋肉痛や関節痛が出る場合があります。必要に応じてお薬が処方されます。 ・退院前に外来化学療法室に見学に行きます。 ・抗癌剤にアルコールの成分が含まれていますので、外来で抗がん剤治療をする場合は、車や自転車の運転をしないようにしてください。 ・手洗い・うがいをこころがけましょう。 