

TC 療法(カルボプラチン+パクリタキセル)治療を受ける患者さん

主治医() 受け持ち看護師() 説明看護師()

日付	/ ()	/ ()	/ ()~退院まで
経過	治療当日まで	治療1日目	治療2日目~退院まで
到達目標	・入院生活や治療を理解することが出来る。	・副作用症状が理解でき症状がある時には医療者に伝えることが出来る。 ・感染予防対策を理解し、実行する。	
治療・処置・薬剤	・現在飲まれているお薬があれば確認します。	・抗がん剤の注射を行います。 抗癌剤を行う前に吐気止めをしてその後下記抗癌剤を使用します。 (1種類) パクリタキセル (2種類) カルボプラチン 治療時間は約4時間半ぐらいです。 	・採血の結果により白血球数の減少がある際は、白血球数を増やす皮下注射があります。(白血球数が増加するまで注射を続けます。)
検査	・必要に応じて採血など行います。		・治療8日目に採血があります。
食事	・制限はありません。	・吐き気や食欲の減少などで食事を食べにくい場合は、食事の変更が可能です。看護師に相談してください。	
清潔	・シャワー浴出来ます。	・点滴を行っている間は蒸しタオルで体を拭きます。	・シャワー浴出来ます(副作用症状できつい時等はタオルで体を拭くことも可能です。)
排泄	・特に制限はありません。	・2日間(24時間)尿を貯めてもらいます(/ の11時から / の11時まで行います) 	
説明・指導	・パンフレットを用いて副作用の説明を行います。	・治療1日目、3日目、5日目の11時に体重測定をしていただきます。 ・点滴の入っている部分が腫れたり、痛みを感じた時は、すぐに看護師に知らせてください。 ☆ 抗癌剤による嘔気・嘔吐・食欲不振・倦怠感・脱毛・骨髄抑制(白血球や血小板が少なくなり感染症や出血しやすくなる)・腎機能障害(急に尿量が少なくなる)・肺機能障害(咳が出やすい、息苦しく感じる)等の副作用が起こる事があります。症状には個人差があります。治療中に気になる症状があれば知らせて下さい。	

・以上はあくまでも標準的なものであり、変更があれば随時お知らせします。