











# シスプラチン療法を受けられる患者さんへ

お名前

様

担当医:

説明看護師:

月日 経過	入院日	治療当日	2日目	3日目	4日目	5日目～退院
達成目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>治療について理解できる</li> <li>副作用について理解できる</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>日常生活の注意点について理解できる</li> </ul>
治療・薬剤 (点滴・内服) 処置		シスプラチンと吐き気予防と利尿剤と水分補給の点滴をします。全部で12時間程かかります。 	吐き気予防と水分補給の点滴をします。全部で11時間程かかります。 	吐き気予防の点滴をします。30分間かかります。		
		吐き気止めの薬(アプレピタントカプセル)を飲みます。→		吐き気止めの薬(デカドロン)を飲みます。→		
検査	採血がある場合があります 	朝食前に 体重を測定します 	朝食前に 体重を測定します 	朝食前に 体重を測定します 	朝食前に 体重を測定します 	
活動・安静度	制限はありません 					
食事	食事制限はありません 					
清潔	シャワー浴できます 					
排泄		11時から尿の量を測定してください。トイレに設置しているコップで量を測って、用紙に記入してください。(24時間)	11時で尿の測定は終了です。			
患者様及びご家族への説明	医師及び薬剤師より治療内容の説明があります <ul style="list-style-type: none"> <li>主な副作用には吐き気・吐く・食欲がなくなる・だるさ・下痢・口内炎・白血球減少などがあります。</li> <li>吐き気・下痢・しゃっくりなどの症状が現れた場合は、我慢せずに看護師にお知らせください。内服や注射で症状の軽減をはかります。</li> <li>たくさんの点滴や利尿剤を使用するので、普段より尿の量が多くなります。</li> <li>尿量が少ない場合は、追加で利尿剤を使用することがあります。</li> <li>食欲がなくなって食事が十分に食べられない場合には、栄養士による相談が受けられます。</li> <li>手洗い・うがいをこころがけましょう。</li> </ul>					