







# FOLFIRI療法を受けられる患者さんへ

お名前

様

担当医:

説明看護師:

月日	/	/	/	/	/ ~
経過	治療前日	治療当日	2日目	3日目	4日目～退院
達成目標	・治療について理解できる ・副作用について理解できる	・チューブとインフューザーポンプの取り扱いがわかる		・ポート針の抜き方がわかる ・日常生活の注意点について理解できる	
治療・薬剤 (点滴・内服) 処置		吐き気止めとイリノテカンとレボホリナートと5-FUを点滴します。全部で2時間30分程かかります  最後に5-FUをインフューザーポンプで投与します。(46時間)		インフューザーポンプの中身がなくなったら、針を抜いて終了です。 <b>針を抜く方法を練習します</b>	
検査	採血がある場合があります 				
活動・安静度	制限はありません 				
食事	食事制限はありません 				
清潔	シャワー浴できます 	治療当日にシャワー浴される場合は、点滴前に済ませてください インフューザーポンプでの投与中は下半身シャワー浴はできます			シャワー浴できます 
排泄	トイレに行けます				
患者様及びご家族への説明	医師及び薬剤師より治療内容の説明があります	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主な副作用には吐き気・吐く・食欲がなくなる・だるさ・口内炎・白血球減少・下痢などがあります。</li> <li>・イリノテカンの副作用で、点滴中に下痢・鼻水がでる・涙がでる・汗がでるなどの症状が起こることがあります。症状がひどいときは注射薬を使用する場合があります。</li> <li>・吐き気などの症状が現れた場合は、我慢せずに看護師にお知らせください。内服や注射で症状の軽減をはかります。</li> <li>・食欲がなくなって食事が十分に食べられない場合には、栄養士による相談が受けられます。</li> <li>・定期的にCVポート刺入部とインフューザーポンプを確認します。</li> <li>・外来化学療法室でできる抗がん剤治療なので、次回より外来通院で治療します。</li> <li>・退院前に外来化学療法室に見学に行きます。</li> <li>・手洗い・うがいをこころがけましょう。</li> </ul>			