

# アバスチン・mFOLFOX6療法を受けられる患者さんへ

お名前

様

担当医:

説明看護師:

月日 経過	治療前日	治療当日	2日目	3日目	4日目～退院
達成目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>治療について理解できる</li> <li>副作用について理解できる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>チューブの取り扱いがわかる</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>針の抜き方がわかる</li> <li>日常生活の注意点について理解できる</li> </ul>	
治療・薬剤 (点滴・内服) 処置		吐き気止めとアバスチンとオキサリプラチンとレボホリナートと5-FUを点滴します。全部で3～4時間程かかります。  5FUを23時間で投与します。 →		5FUを23時間で投与します。 → 吐き気止めの薬(デカドロン)を飲みます。 →	
検査	採血がある場合があります 				
活動・安静度	制限はありません 				
食事	食事制限はありません 				
清潔	シャワー浴できます 	治療当日にシャワー浴される場合は、点滴前に済ませてください 点滴中は身体拭きはできません			シャワー浴できます 
排泄	トイレに行けます				
患者様及びご家族への説明	医師及び薬剤師より治療内容の説明があります	<ul style="list-style-type: none"> <li>主な副作用には吐き気・吐く・食欲がなくなる・だるさ・アレルギー症状・白血球減少・下痢・しびれ・粘膜からの出血・血圧が高くなるなどがあります。</li> <li>冷たい物に触れるとしびれを感じたり、冷たい飲み物を飲むとのが締めつけられる感じがすることがあります。</li> <li>3～5日間程は冷たい食べ物・飲み物の摂取や冷たい水に触ったりしないようにしてください。</li> <li>吐き気などの症状が現れた場合は、我慢せずに看護師にお知らせください。内服や注射で症状の軽減をはかります。</li> <li>食欲がなくなって食事が十分に食べられない場合には、栄養士による相談が受けられます。</li> <li>高血圧になることがありますので、退院後も1日1回の血圧測定を推奨します。</li> <li>手洗い・うがいをこころがけましょう。</li> </ul>			 