







パクリタキセル+サイラムザ療法を受けられる患者さんへ

お名前

さん

担当医:

説明看護師:

月日	/	/	/	/	/ ~
経過	治療前日	治療当日	2日目	3日目	4日目~退院
達成目標	・入院生活や治療について医師や薬剤師、看護師の説明が理解できる。	・副作用(吐き気・食欲不振、疲労感、頭痛など)やふらつきが出現したときに看護師に知らせることができる。		・退院後の生活や次回の治療について、不安や疑問があれば確認することができる。	
治療・薬剤(点滴・内服)処置		アレルギー症状を予防・軽減するお薬とサイラムザを点滴します。 パクリタキセル、サイラムザ投与中は心電図モニターを装着します。			
検査	採血がある場合があります 				
活動・安静度	制限はありません 				
食事	食事制限はありません 				
清潔	シャワー浴できます 	治療当日にシャワー浴される場合は、点滴前に済ませてください		シャワー浴できます 	
排泄	トイレに行けます				
患者様及びご家族への説明	医師及び薬剤師より治療内容の説明があります	<ul style="list-style-type: none"> ・サイラムザの主な副作用には吐き気・吐く・食欲がなくなる・だるさ・アレルギー症状・白血球減少・下痢・粘膜からの出血・血圧が高くなるなどがあります。 ・パクリタキセルの主な副作用には吐き気・吐く・食欲がなくなる・だるさ・アレルギー症状・白血球減少・手先や足先のしびれ・筋肉痛・関節痛・発熱・口内炎・脱毛などがあります。 <p>※医師の説明用紙も参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・吐き気などの症状が現れた場合は、我慢せずに看護師にお知らせください。内服や注射で症状の軽減をはかります。 ・食欲がなくなって食事が十分に食べられない場合には、栄養士による相談が受けられます。 ・外来化学療法室でできる抗がん剤治療なので、次回より外来通院で治療します。 ・退院前に外来化学療法室に見学に行きます。 ・高血圧になることがありますので、退院後も1日2回の血圧測定を推奨します。 ・手洗い・うがいをこころがけましょう。 			

