
血管造影（TACE：肝動脈化学塞栓療法 ・ TAI：肝動脈動注化学療法）を受けられる患者様へ

患者氏名　　様　　担当医師：　　説明看護師：

月日 ／ 項目	／	／		／	／	／
日時	治療前日	治療当日		治療後1日目	治療後2日目	治療後3日目～
		治療前	治療後			
目標	治療について理解できる		指示された安静を守り、合併症をおこさない。			
治療・薬剤（点滴・内服） 処置	足の股（穿刺予定部）の剃毛をします。 ※血液をサラサラにする薬を服用している方はお知らせください。	放射線科治療室へ行く時間は （　　：　　）頃です。 ・検査着に着替えます。 ・尿の管を入れるので処置室に行く前は排尿を我慢して下さい。 ・点滴をします。 ・緊張をとる筋肉注射をします。 ・両足の甲の動脈に印を付けます。 ・両足にストッキングをはきます。 ・ストレッチャーで治療室に行きます。	治療後は、体温・脈拍・血圧などを測定し、状態を観察します。 点滴があります。 （止血剤・胃薬・抗生剤など） 	・朝、医師が穿刺部の消毒をします。  医師の診察後に尿の管を抜いて、検査着から寝衣に着替えます。 歩行可能になります。 ・朝と夕に抗生剤の点滴があります 	・朝と夕に抗生剤の点滴があります	
検査	採血、出血時間の検査などがあります。 			採血があります。 	適宜採血などがあります。	適宜採血などがあります。 
活動・安静度	病院内は自由です。	治療開始の1時間前には病室にお戻り下さい。	翌朝までベット上安静です。3時間後に異常がなければ側臥位や穿刺していない方の足は曲げてもいいです。	診察後に歩行可能になります。 初めて歩くときは、看護師が付き添いますのでお知らせください。	安静制限はありません。	安静制限はありません。 
食事	食事制限はありません。 	朝食は食べられます。 昼食は絶食です。	吐き気がなければ飲水できます。 3時間後より食事ができます。 （ベッドに寝たままで食事です。）	食事制限はありません。 	食事制限はありません。 	食事制限はありません。 
清潔	シャワーが浴できます。 	シャワー浴は午前中に済ませましょう。		体拭きを行います。 	刺入部に異常がなければ、シャワー浴ができます。 	刺入部に異常がなければ、 シャワー浴ができます。 
排泄	トイレに行けます。	尿が出る管が入っています。	尿が出る管が入っています。	診察後に尿の管を抜きます。 トイレに行けるようになります。	トイレに行けます。	トイレに行けます。
患者様及びご家族への説明	医師から治療について説明があります。 同意書にサインをして、提出をお願いします。 	治療の時間は人によって差がありますがおおよそ2～3時間程度です ※前立腺肥大や緑内障がある方はお知らせください。	治療終了後、針を刺したところからの出血、腰や腹部の痛み、足先の冷たさ、しびれ、吐き気、尿の出にくさなどがありましたらお知らせ下さい。			

＊状況に応じて予定が変更になる場合があります。ご不明な点がありましたら、お尋ね下さい。

九州がんセンター消化器肝臓内科　2017年2月改訂